












ANVÄNDNING AF FLYECTO VET, 12,5 MG/ML (CYPERMETRIN: CIS:TRANS/80:20)*#

Läkemedlet innehåller ett färgämne för att göra det lättare att identifiera de djur som har behandlats. Färgen försvinner från ullen inom 48 timmar efter appliceringen.

Parasiter	Dos	Munstycke	Beskyttelse	Kommentar	
	5 ml 		4 veckor	<ul style="list-style-type: none"> • Var försiktig så att produkten inte kommer i fårets ögon. • Återbehandla vid behov. 	
	Får/lam > 10 kg 10 ml/20 kg Maks. 40 ml				
	Lam < 10 kg 5 ml + 10 ml efter 3 veckor				
	5 ml/20 kg maks. 20 ml 			<ul style="list-style-type: none"> • Fåren kan behandlas efter klippning eller när som helst under året. 	
	Förebyggande < 25 kg 20 ml 25 till 40 kg 30 ml > 40 kg 40 ml 50% skuldror, ryg och flanker 50% till bakdelen 	Behandling 2,5 ml/100-150 cm ² (storlek som en hand). För de flesta angrepp krävs 5-10 ml.	Förebyggande 	Behandling 	Förebyggande <ul style="list-style-type: none"> • Endast de områden som täcks av spray skyddas mot spyflugeangrepp • 20 cm avstånd mellan munstycket och ullen • Administrera inte till djur med mindre än 12,5 kg kroppsvikt Behandling Larverna avlägsnas och dödas inom några timmar.
					6 – 8 veckor
<p>* Lamm yngre än en vecka ska inte behandlas # Applicera inte på lammets svans, eftersom tackor identifierar sina lamm delvis genom doften i området kring svansen.</p>					

ANVÄNDNING AF FLYECTO VET, 12,5 MG/ML (CYPERMETRIN: CIS:TRANS/80:20)

Läkemedlet innehåller ett färgämne för att göra det lättare att identifiera de djur som har behandlats. Färgen försvinner från ullen inom 48 timmar efter appliceringen.



Flyecto vet., pour-on, 12,5 mg/ml, lösning til får, Rx. Innehåll: 1 ml Flyecto innehåller cypermetrin 12,5 mg.

Egenskap: Cypermetrin är ett nervgift som påverkar axonerna i insekters perifera och centrala nervsystem genom interaktioner med natriumkanalerna. ATCvet-kod: QP53AC08.

Indikation: Behandling och kontroll av fårhuvudfluga. Behandling av fästingar och bitande löss. Förebyggande och behandling av spyflugeangrepp.

Kontraindikation: Lamm yngre än en vecka ska inte behandlas. Administrera inte till djur med mindre än 12,5 kg kroppsvikt vid förebyggande av spyflugeangrepp. Undvik att behandla mycket unga lamm om det är ovanligt varmt för årstiden. Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena.

Särskilda varningar för respektive djurslag: Endast för utvärtes bruk. Frekvent och upprepad användning av antiparasitära medel från samma klass kan öka risken för resistensutveckling. Undvika application på lammets svans. Var försiktig så att läkemedlet inte kommer i fårets ögon.

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning: Denna produkt är skadlig vid förtäring och kan orsaka irritation i hud, ögon eller andningsvägar. Denna produkt kan även orsaka överkänslighetsreaktioner. Får inte komma i kontakt med hud och/eller ögon. Använd på väl ventilerad plats, och undvik att andas in ånga. Tvätta omedelbart bort stänk på hud och ögon med rikligt med rent vatten. Om irritation kvarstår kontakta genast läkare och visa bipacksedeln för läkaren. Vid oavsiktlig förtäring eller kontakt med munnen ska du omedelbart skölja munnen med rikligt med vatten och kontakta läkare.

Övriga försiktighetsåtgärder: Cypermetrin är extremt giftigt för vattenlevande organismer och dyngorganismer. Med tanke på riskerna för miljön ska användningen av produkten begränsas till en behandling per år och betesmark.

Biverkningar: Ingen kända.

Användning under dräktighet: Kan användas under dräktighet. Dräktiga tackor måste behandlas med försiktighet.

Interaktioner: Produkten ska endast appliceras med rekommenderad applikatorpistol, eftersom produkten kan skada vissa delar i konventionella doseringspistoler.

Dos och administreringsätt: Administrera med hjälp av rekommenderad applikatorpistol enligt följande: *Spyflugor:* Förebyggande. < 25 kg – 20 ml; 25 ≤ < 40 kg – 30 ml; > 40 kg – 40 ml. Behandling ved spyflugeangrepp. 2,5 ml per 100 – 150 cm² på alla angripna dele. *Löss:* 5 ml per 20 kg kroppsvikt upp til max 20 ml. *Fästingar:* Vuxna får och lamm över 10 kg: 10 ml per 20 kg kroppsvikt, upp till max 40 ml. Lamm under 10 kg: 5 ml, följt av en andra applikation med 10 ml 3 veckor senare. *Fårhuvudfluga:* 5 ml per djur oberoende av storlek.

Överdoser: Tecken på förgiftning hos däggdjur är skakningar, hyperexcitabilitet, salivering, korea, atetos och förlamning, som i sällsynta fall leder till döden.

Karenstider: slakt 8 dygn, mjölk: 5 dygn.

Miljöegenskaper: Cypermetrin är måttligt persistent och förflyttar sig inte i marken. Det är mycket giftigt för vattenlevande ryggradslösa organismer. Cypermetrin är giftigt för dynginsekter och bin. Långsiktiga effekter på dynginsekter som orsakas av kontinuerlig eller upprepad användning av produkten kan inte uteslutas.

Information lämnas av: Bimeda Nordic ApS, DK-5250, Odense SV, Danmark
tel.: +45-22530289. SPC godkänd: 2019-06-21. Receptbelagt.
För mer information, se www.fass.se.